الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الاستدراكية 2022

– الموضوع –

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

SSSSSSSSSSSSSSSSSSS-SS | RS 25

المادة	الرياضيات	مدة الإنجاز	4
الشعبة أو المسلك	مسلك العلوم الرياضية – أ و ب - الترجمة بالفرنسية	المعامل	9

- La durée de l'épreuve est de 4 heures.

- L'épreuve comporte quatre exercices indépendants.

- Les exercices peuvent être traités selon l'ordre choisi par le candidat.

- L'exercice1 se rapporte à l'analyse ……..……..…(10 pts)

- L'exercice2 se rapporte aux nombres complexes.....….(3.5 pts)

- L'exercice3 se rapporte aux structures algébriques…...(3.5 pts)

- L'exercice4 se rapporte à l'arithmétique ……..…....(3 pts)

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé

L'usage de la couleur rouge n'est pas autorisé

EXERCICE1 : (10 points)

0.25 **A**-1- Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}) \; ; \; 1+x \leq e^x$

0.25 2-a) Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}^+) \; ; \; 0 \leq 1-e^{-x} \leq x$

0.5 b) En déduire que : $(\forall x \in \mathbb{R}^+) \; ; \; 0 \leq 1-x+\frac{x^2}{2}-e^{-x} \leq \frac{x^3}{6}$

0.5 c) Montrer que : $\lim\limits_{x \to 0^+} \frac{1-x-e^{-x}}{x^2} = -\frac{1}{2}$

B- On considère la fonction f définie sur $I = [0,+\infty[$ par :

$$f(0)=1 \quad \text{et} \quad (\forall x \in]0,+\infty[) \; ; \quad f(x)=\frac{e^{-x}-e^{-2x}}{x}$$

Et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$

0.5 1-a) Montrer que f est continue à droite en 0

0.25 b) Vérifier que : $(\forall x > 0) \quad ; \quad \frac{f(x)-1}{x} = \frac{1-2x-e^{-2x}}{x^2} - \frac{1-x-e^{-x}}{x^2}$

0.5 c) En déduire que f est dérivable à droite en 0 et que le nombre dérivé à droite en 0 est $-\frac{3}{2}$

0.5 2-a) Montrer que : $(\forall x > 0) \quad ; \quad f'(x)=\frac{e^{-2x}}{x^2}\left(2x+1-e^x(1+x)\right)$

0.5 b) Montrer que : $(\forall x > 0) \quad ; \quad f'(x) \leq -e^{-2x}$

(On pourra utiliser : $1+x \leq e^x$)

0.25 c) En déduire le sens de variations de f sur I

3- **On admet que** : $(\forall x > 0)$; $f''(x)=\frac{e^{-2x}}{x^3}\left(-4x^2-4x-2+e^x(2+2x+x^2)\right)$

0.25 a) Montrer que : $(\forall x \geq 0) \quad ; \quad 1+x+\frac{x^2}{2} \leq e^x$

0.5 b) En déduire que : $(\forall x > 0) \quad ; \quad f''(x) > 0$

4-**On admet que** : $\lim\limits_{x \to 0^+} f'(x) = -\frac{3}{2}$

0.5 a) Montrer que : $\lim\limits_{x \to +\infty} f'(x) = 0$

0.5 b) En déduire que : $(\forall x \in I) \; ; \; |f'(x)| \leq \frac{3}{2}$

0.5 5-a) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.

0.25 b) Dresser le tableau de variations de f

0.25 c) Déterminer la position relative de la courbe (C) par rapport à sa demi-tangente au point $T(0;1)$

0.5 d) Représenter graphiquement la courbe (C) dans le repère $(O;\vec{i},\vec{j})$

C-1- Pour tout x de $[0;1]$, on pose : $g(x)= f(x)- x$

0.5 a) Montrer que g est une bijection de $[0;1]$ vers un intervalle J que l'on déterminera.

0.5 b) Montrer qu'il existe un unique réel $a \in]0;1[$ tel que $f(a)= a$

2- Pour tout entier naturel non nul n et pour tout entier $k \in \{0;1.....;n\}$, on considère les nombres réels $x_k = \frac{ka}{n}$ et on pose :

$$I_k = \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t)dt \quad \text{et} \quad J_k = \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x_k)dt$$

0.5 a) Montrer que : $\forall k \in \{0;1.....;n\}$; $|J_k - I_k| \leq \frac{3}{2}\int_{x_k}^{x_{k+1}} (t - x_k)dt$

0.5 b) En déduire que : $\forall k \in \{0;1.....;n\}$; $|J_k - I_k| \leq \frac{3}{4}\left(\frac{a}{n}\right)^2$

3- On pose : $L = \int_0^a f(t)dt$

0.5 a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $\left|\frac{a}{n}\sum_{k=0}^{k=n-1} f\left(\frac{ka}{n}\right) - L\right| \leq \frac{3}{4}\frac{a^2}{n}$

0.25 b) En déduire que : $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{a}{n}\sum_{k=0}^{k=n-1} f\left(\frac{ka}{n}\right) = \int_0^a f(t)dt$

EXERCICE2 :(3.5 points)

Soit $m \in \mathbb{C} \setminus \{-1;0;1\}$

I- On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation (E_m) d'inconnue z :

$$(E_m) : \quad mz^2 - (m-1)^2 z - (m-1)^2 = 0$$

0.25 1-a) Montrer que le discriminant de l'équation (E_m) est : $\Delta = (m^2-1)^2$

0.5 b) Déterminer z_1 et z_2 les deux solutions de l'équation (E_m)

0.5 2) On prend uniquement dans cette question $m = e^{iq}$, avec $0 < q < p$

Ecrire z_1 et z_2 sous forme exponentielle.

II- Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O,\vec{u},\vec{v})$.

On considère les deux points A et B d'affixes respectives $m-1$ et $\frac{1}{m}-1$

0.5 1- Montrer que les points O , A et B sont alignés si et seulement si $m \in \mathbb{R}$

2- On suppose que m n'est pas un nombre réel.

Soient C l'image du point B par la rotation de centre A et d'angle $\frac{p}{3}$ et D l'image du point A par la rotation de centre O et d'angle $\frac{p}{3}$

et soient $P(p)$, $Q(q)$ et $R(r)$ les milieux respectifs des segments $[AC]$, $[AD]$ et $[OB]$

0.5 a) Montrer que l'affixe du point C est : $c = m-1+\left(\frac{1}{m}-m\right)e^{i\frac{p}{3}}$

et que l'affixe du point D est : $d = (m-1)e^{i\frac{p}{3}}$

0.5 b) Montrer que : $2(p-r) = m-1+\left(\frac{1}{m}-m\right)\left(e^{i\frac{p}{3}}-1\right)$

et $2(q-r) = (m-1)e^{i\frac{p}{3}}-\left(\frac{1}{m}-m\right)$

0.25 c) Montrer que : $q-r = e^{i\frac{p}{3}}(p-r)$

0.5 d) Quelle est la nature du triangle PQR ? (justifier votre réponse)

EXERCICE3 : (3.5 points)

On rappelle que $(M_3(\mathbb{R}),+,\times)$ est un anneau unitaire non commutatif et non intègre d'unité $I = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ (La loi $\times$ étant la multiplication usuelle des matrices)

Pour tout réel a on pose $M(a) = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ a+1 & 3 & -1\\ 2a+3 & 6 & -2\end{pmatrix}$

et soit $G = \{M(a) / a \in \mathbb{R}\}$

1- Soit φ l'application de $\mathbb{R}$ vers $M_3(\mathbb{R})$ définie par : $(\forall a \in \mathbb{R}) \; ; \; \varphi(a) = M(a)$

0.5 a) Montrer que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{R},+)$ vers $(M_3(\mathbb{R}),\times)$

0.5 b) Montrer que $\varphi(\mathbb{R}) = G$, en déduire que $(G,\times)$ est un groupe commutatif.

0.5 c) Déterminer J l'élément neutre dans $(G,\times)$

0.5 d) Déterminer l'inverse de $M(a)$ dans $(G,\times)$

0.5 e) Résoudre dans $(G,\times)$ l'équation : $M(1) \times X = M(2)$

0.25 2-a) Montrer que : $(\forall a \in \mathbb{R}) \; ; \; M(a) \times J = M(a) \times I$

0.5 b) En déduire que pour tout $a \in \mathbb{R}$, $M(a)$ n'est pas inversible dans $(M_3(\mathbb{R}),\times)$

0.25 c) Vérifier que les matrices de la forme $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x+2 & 3 & 0 \\ 3x+5 & 6 & 1 \end{pmatrix}$ avec $x \in \mathbb{R}$, sont des solutions dans $(M_3(\mathbb{R}),\times)$ de l'équation : $M(1) \times X = M(2)$

EXERCICE4 (3 points)

0.5 1- Montrer que 137 est un nombre premier.

0.5 2- Déterminer un couple (u,v) de $\mathbb{Z}^2$ tel que : $38u + 136v = 2$

3- Soit $x \in \mathbb{Z}$ tel que : $x^{38} \equiv 1 \; [137]$

0.5 a) Montrer que x et 137 sont premiers entre eux.

0.5 b) Montrer que : $x^{136} \equiv 1 \; [137]$

0.5 c) Montrer que : $x^2 \equiv 1 \; [137]$

0.5 4- Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation (E): $x^{19} \equiv 1 \; [137]$

FIN